

数学クォータ科目「数学」第1回 (4/4)

合成関数とその微分

佐藤 弘康 / 日本工業大学 共通教育学群

【復習】 1 変数関数の合成関数とその微分

- 2つの関数 $y = f(t)$ と $t = g(x)$ に対して、 $y = f(g(x))$ で定まる独立変数 x の関数を、「 f と g の合成関数」という。
- $y = f(g(x))$ の導関数は、それぞれの関数の積となる。

$$y' = f'(g(x)) g'(x)$$

または

$$\frac{dy}{dx}(x) = \frac{df}{dt}(g(x)) \frac{dg}{dx}(x), \quad \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dt} \frac{dg}{dx}$$

と表す場合もある。

- 「1 変数関数の合成関数の微分」の効用：
複雑な関数も、いくつかの単純な関数の合成関数と見ることにより、
微分計算が容易になる。

2変数関数の合成関数とその微分 (1)

2変数関数 $f(x, y)$ に対し,

(1) 2つの1変数関数 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ を $f(x, y)$ に代入した関数

$$z(t) := f(\varphi(t), \psi(t))$$

は独立変数 t の1変数関数となる. この関数の導関数は

$$z'(t) = f_x(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) + f_y(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t).$$

または

$$\frac{dz}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(t), \psi(t)) \frac{d\varphi}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(t), \psi(t)) \frac{d\psi}{dt}(t),$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\psi}{dt}.$$

2 変数関数の合成関数 (1) の意味

(1) $f(x, y)$ と $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ の合成



→ $f(x, y)$ を平面内の**曲線** $(x, y) = (\varphi(t), \psi(t))$ に制限すること.

曲線のパラメータ表示

- 2つの関数の組 $(\varphi(t), \psi(t))$ は独立変数 t に対して、**平面の点**を対応させるものである.
- t を定義域内で動かすとき、点 $(\varphi(t), \psi(t))$ は平面内の**曲線**をなす.



2変数関数の合成関数（1）の例

例1) $(x, y) = (\cos t, \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi$ は、原点を中心とする半径1の円である。



2変数関数の合成関数（1）の例

例2) $(x, y) = (ht + a, kt + b)$ は, 点 (a, b) を通り, 傾きが $\frac{k}{h}$ の直線である.



2変数関数の合成関数とその微分 (2)

2変数関数 $f(x, y)$ に対し,

(1) 2つの2変数関数 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ を $f(x, y)$ に代入した関数

$$z(u, v) := f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$$

は独立変数 u, v の2変数関数となる. この関数の偏導関数は

$$z_u(u, v) = f_x(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \varphi_u(u, v) + f_y(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \psi_u(u, v),$$

$$z_v(u, v) = f_x(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \varphi_v(u, v) + f_y(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \psi_v(u, v).$$

または



$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial v}.$$

2変数関数の合成関数（2）の意味

(1) $f(x, y)$ と $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ の合成

→ **座標変換** $(x, y) = (\varphi(u, v), \psi(u, v))$ により, 関数 $f(x, y)$ を uv -平面上の関数とみること.

例) 極座標変換 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$



2 変数関数の合成関数 (2) の微分の計算例

例題 次の関数 $z = f(x, y)$ を $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ と極座標変換し, r, θ に関して偏微分しなさい.

例3) $f(x, y) = x^2 + y^2$

[解1] 関数を合成すると

$$\begin{aligned} z &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) = (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 \\ &= r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= r^2. \end{aligned}$$

よって,

$$z_r(r, \theta) = 2r, \quad z_\theta(r, \theta) = 0.$$

2変数関数の合成関数（2）の微分の計算例

例題 次の関数 $z = f(x, y)$ を $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ と極座標変換し, r, θ に関して偏微分しなさい.

例3) $f(x, y) = x^2 + y^2$

[解2] 合成関数の偏微分の公式を利用する;

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 2x \\ f_y(x, y) = 2y \end{cases} \begin{cases} x_r = \frac{\partial}{\partial r}(r \cos \theta) = \cos \theta \\ y_r = \frac{\partial}{\partial r}(r \sin \theta) = \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}(r \cos \theta) = -r \sin \theta \\ y_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}(r \sin \theta) = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{よって,}$$

$$z_r = f_x(x, y) x_r + f_y(x, y) y_r = 2r \cos \theta \cdot \cos \theta + 2r \sin \theta \cdot \sin \theta = 2r,$$

$$z_\theta = f_x(x, y) x_\theta + f_y(x, y) y_\theta = 2r \cos \theta \cdot (-r \sin \theta) + 2r \sin \theta \cdot r \cos \theta = 0.$$

※ 2通りの方法で, 同じ結果が得られた.

2変数関数の合成関数（2）の微分の計算例

例題 次の関数 $z = f(x, y)$ を $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ と極座標変換し, r, θ に関して偏微分しなさい.

例 4) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$

例 3) と同様に, 2通りの方法で偏導関数を求めてみよう.