

数学クォータ科目「基礎数学 II」第 6 回

定積分

佐藤 弘康 / 日本工業大学 共通教育学群

これまでのまとめ (1)

- 関数 $y = f(x)$ がある.
 - $x = a$ における**微分係数** (**平均変化率** の極限)
($y = f(x)$ のグラフの $x = a$ における接線の傾きの値)

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

- **導関数** (関数 $f(x)$ の**微分**) $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$

- **微分の性質** 関数 $f(x), g(x)$ と定数 k に対し,

$$(1-1) \{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$(1-2) \{k f(x)\}' = k f'(x)$$

これまでのまとめ (2)

- 基本的な関数の微分

$$(2-1) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \text{ は実数})$$

$$(2-2) (k)' = 0 \quad (\text{すなわち, 定数関数の微分は消える})$$

$$(2-3) (\sin x)' = \cos x$$

$$(2-4) (\cos x)' = -\sin x$$

$$(2-5) (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

$$(2-6) (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$$

$$(2-7) (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a} \quad \text{特に, } (\log x)' = \frac{1}{x}$$

$$(2-8) (a^x)' = a^x \log a \quad \text{特に, } (e^x)' = e^x$$

これまでのまとめ (3)

- 微分公式

(3-1) 合成関数の微分：
$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

特に，
$$\frac{d}{dx} f(ax + b) = a f'(ax + b)$$

(3-2) 積の微分公式：
$$\{f(x) \cdot g(x)\}' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

(3-3) 商の微分公式：
$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

特に，
$$\left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{g(x)^2}$$

(3-4) 対数微分法：
$$f'(x) = f(x) \cdot (\log f(x))'$$

これまでのまとめ (4)

- 関数 $y = f(x)$ がある.
 - $F'(x) = f(x)$ を満たす関数を $f(x)$ の**原始関数**という.
 - $\int f(x) dx = F(x) + C$ を $f(x)$ の**不定積分**という.

- **不定積分の性質** 関数 $f(x), g(x)$ と定数 k に対し,

$$(4-1) \int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$(4-2) \int \{k f(x)\} dx = k \int f(x) dx$$

- **積分の計算方法**

(5-1) 置換積分法

(5-2) 部分積分法

今週のこと

- **定積分**の計算方法
 - **置換積分法** を利用した定積分の計算
 - **部分積分法** を利用した定積分の計算
 - 三角関数の加法定理（積和の公式）を利用した積分の計算

定積分

- 区間 $a \leq x \leq b$ とそこで有界な関数 $f(x)$ に対して定まる量.
- 「 $x = a$ から b までの $f(x)$ の定積分」を $\int_a^b f(x) dx$ と書く.
→ リーマン和の極限として定義される. ※詳細は次々回
- 定積分の値は

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b := F(b) - F(a)$$

となる. ただし, $F(x)$ は $f(x)$ の原始関数 (のひとつ).

- なぜ, 定積分が原始関数を利用して計算できるのか?
→ 微分積分学の基本定理 が成り立つから. ※詳細は次々回

定積分の性質

関数 $f(x), g(x)$ と定数 a, b, c, k に対し、以下が成り立つ。

$$(6-1) \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$(6-2) \int_a^b \{k f(x)\} dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$(6-3) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$(6-4) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$(6-5) \int_a^b f(x) dx = \int_c^b f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$$

置換積分法・部分積分法を利用した定積分の計算

置換積分法

定積分 $\int_a^b f(x) dx$ において、 $x = g(t)$ と置き換えるとき、

$$a = g(\alpha), \quad b = g(\beta)$$

であるとする。このとき、

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t)) g'(t) dt$$

部分積分法

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

三角関数の性質を利用した積分計算

問 1) $I = \int \sin x \cos x dx$

- 置換積分を利用 : $\sin x = t$ とおくと, $\frac{dt}{dx} = \cos x$ より, $\cos x dx = dt$.
よって,

$$I = \int t dt = \frac{1}{2}t^2 + C = \frac{1}{2}\sin^2 x + C$$

- 部分積分を利用

$$I = \int \sin x (\sin x)' dx = \sin^2 x - \int (\sin x)' \sin x dx$$

$$= \sin^2 x - \int \cos x \sin x dx = \sin^2 x - I.$$

$$2I = \sin^2 x \quad \therefore I = \frac{1}{2}\sin^2 x + C$$

三角関数の性質を利用した積分計算

問1) $I = \int \sin x \cos x dx$

- 倍角の公式（加法定理） を利用： $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ より、

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int 2 \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) = -\frac{1}{4} \cos 2x + C \end{aligned}$$

注意) 前ページの式と同じなのか？

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} \cos 2x + C &= -\frac{1}{4} (1 - 2 \sin^2 x) + C \\ &= \frac{1}{2} \sin^2 x + \left(-\frac{1}{4} + C \right) = \frac{1}{2} \sin^2 x + C. \end{aligned}$$

三角関数の性質を利用した積分計算

問2) $I = \int \sin 3x \cos x dx$

- 部分積分を利用して計算することもできるが、三角関数の加法定理から導かれる 積和の公式 を利用して計算することができる。
- 正弦関数の加法定理

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

より

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

- よって,

$$I = \int \frac{1}{2} \{ \sin(3x + x) + \sin(3x - x) \} dx = \frac{1}{2} \int (\sin 4x + \sin 2x) dx = \dots$$