

5 同次座標系と透視投影

問題 5.2. §5.3.1 を参照せよ.

問題 5.3. 一般に, 透視投影によって直線は直線に移る (*Mathematica* で実験してみればよい). しかし, 視点 S を通る直線は投影面上の 1 点に移る (つまり, パラメーター表示 $\vec{p}(t) = \vec{s} + t\vec{u}$ の直線に対し, S を視点とする透視投影 Φ による像 $\Phi(\vec{p}(t))$ はパラメーター t に依存しない点となる).

問題 5.5. (5.8) 式の \vec{u} を \vec{n} とすればよい. $\Psi(\vec{p}) = \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$.

問題 5.6. xy -平面の方程式は $z = 0$ なので, 問題 5.5 の解の式において $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $d = 0$ とすればよい.

$$\Psi(\vec{p}) = \vec{p} - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle \vec{n} = (p_1, p_2, p_3) - p_1(1, 0, 0) = \underline{(0, p_2, p_3)}.$$

問題 5.8. $\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{u}$ に対し, $\Psi(\vec{p})$ を計算すると, t に依存しない 点 となることがわかる.

問題 5.9. $S(t) = \vec{s} + t\vec{u}$ とおくと

$$\begin{aligned} \Phi_{(S(t), \pi)}(\vec{p}) &= \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\langle (\vec{v} + t\vec{u}) - \vec{p}, \vec{n} \rangle} ((\vec{v} + t\vec{u}) - \vec{p}) \\ &= \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\langle (\vec{v} - \vec{p}) + t\vec{u}, \vec{n} \rangle} ((\vec{v} - \vec{p}) + t\vec{u}) \\ &= \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{v} - \vec{p}, \vec{n} \rangle + t\langle \vec{u}, \vec{n} \rangle} ((\vec{v} - \vec{p}) + t\vec{u}) \\ &= \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\frac{1}{t}\langle \vec{v} - \vec{p}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle} \left(\frac{1}{t}(\vec{v} - \vec{p}) + \vec{u} \right) \end{aligned}$$

となる. 厳密な議論は避け, 直感的に極限を解釈する. 上の式において $t \rightarrow \infty$ とすると, $\frac{1}{t}(\vec{v} - \vec{p})$ は $\vec{0}$ ベクトルに収束するので,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi_{(S(t), \pi)}(\vec{p}) = \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{n} \rangle} \vec{u} = \Psi_{(\vec{u}, \pi)}(\vec{p}).$$

問題 5.13.

$$(1) \left(\begin{array}{ccc|c} E_3 & & & \vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} E_3 & & & \vec{v} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} E_3 & & & \vec{u} + \vec{v} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$(2) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & \vec{u} \\ E_3 & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & -\vec{u} \\ E_3 & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

問題 5.14.

$$(1) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ M & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ N & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ MN & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$(2) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ M & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ M^{-1} & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

問題 5.15.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} & & & \vec{u} \\ E_3 & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ M & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & \vec{u} \\ M & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ M & & & 0 \\ & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} & & & \vec{u} \\ E_3 & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & M\vec{u} \\ M & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

問題 5.16.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} & & & \vec{u} \\ M & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & -M^{-1}\vec{u} \\ M^{-1} & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

問題 5.17. (1) $\begin{pmatrix} \sigma_3 & 0 & -\sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_3 & -\sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_0 & \sigma_3 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} \sigma_2 & -\sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sigma_3 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & -\sigma_0 & 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}$

問題 5.19. 視点 V の同次座標を $(20 : 6 : 1 : 2)$ とすると, 平面 $x = 0$ への透視投影は行列

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 20 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 20 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$

の積として表される. 6 点 A, B, C, D, E, F の同次座標をそれぞれ

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9 \\ 2 \end{bmatrix}$$

とすると, Φ_V による投影像の同次座標は

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 14 \\ 59 \\ 18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 26 \\ 61 \\ 22 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -14 \\ 61 \\ 22 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -26 \\ 59 \\ 18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 60 \\ 40 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 180 \\ 40 \end{bmatrix}$$

となる. これを直交座標に変換すると

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{7}{9} \\ \frac{59}{18} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{13}{11} \\ \frac{61}{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{7}{11} \\ \frac{61}{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{13}{9} \\ \frac{59}{18} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix}.$$

したがって, ワイヤーフレームは下図のようになる.




図 3 問題 3.2 のワイヤーフレーム

問題 5.20. 直交行列とは ${}^tAA = A{}^tA = I_n$ を満たす行列 A のことである. 行列を

$$A = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \dots \quad \vec{a}_n)$$

とベクトルが並んだものを見ると, A が直交行列であることは「任意の i, j について, $\langle \vec{a}_i, \vec{a}_j \rangle = \delta_{ij}$ が成り立つ」ことと同値である (つまり, すべての列ベクトルが互いに直交する単位ベクトルである).

3 次の直交行列について考える. 空間ベクトル \vec{a}, \vec{b} に対して, 外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ は「 \vec{a} と \vec{b} の両方に直交し, 長さは \vec{a} と \vec{b} がつくる平行四辺形の面積の値に等しい」ベクトルである. もし, \vec{a} と \vec{b} が直交する単位ベクトルならば, $\vec{a} \times \vec{b}$ も \vec{a} と \vec{b} に直交するので, これらは互いに直交する. さらに, \vec{a} と \vec{b} がつくる平行四辺形は 1 辺の長さが 1 の正方形だから面積は 1 である. 以上のことから, 行列 $(\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{a} \times \vec{b})$ は直交行列であることがわかる.

問題 5.22. 平面 $3x - 4y + 5z = 6$ の法線ベクトルを $\vec{n} = (3, -4, 5)$ とおくと, この方程式は $\vec{n} \cdot \vec{x} = 6$ と書ける. \vec{n} と直交するベクトルとして, $\vec{m} = (4, 3, 0)$ を選ぶと, $\vec{n} \times \vec{m} = (-15, 20, 25) = 5(-3, 4, 5)$. したがって, これらが単位ベクトルになるように正規化し, それを並べて

$$M = \begin{pmatrix} \frac{3}{5\sqrt{2}} & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5\sqrt{2}} \\ -\frac{4}{5\sqrt{2}} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

とする. また, \vec{u} は $\vec{u} \cdot \vec{n} = 6$ を満たせばよいので, 例えば, $(2, 0, 0)$ とか $(0, 1, 2)$ など.

問題 5.24. 問題 5.22 の直交行列 M と $\vec{u} = (2, 0, 0)$ に対して, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \vec{u}$ と座

標変換する. すると, 投影面 π は $x'y'z'$ -座標系では方程式 $x' = 0$ となる.

視点 S の同次座標を $(8 : -9 : 6 : 1)$ とし, これを $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ -座標系における同次座標で表すと

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} M & & & \vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} &= \left(\begin{array}{ccc|c} M^{-1} & & & -M^{-1}\vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \left(\begin{array}{ccc|c} {}^tM & & & -{}^tM\vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{42\sqrt{2}}{5} \\ -\frac{3}{5} \\ -\frac{12\sqrt{2}}{5} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42\sqrt{2} \\ -3 \\ -12\sqrt{2} \\ 5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

よって, $x'y'z'$ -座標系における平面 $x' = 0$ への透視投影を表す行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 42\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 12\sqrt{2} & 0 & 42\sqrt{2} & 0 \\ -5 & 0 & 0 & 42\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

である.

以上のことから, この透視投影 Φ を表す行列は

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} M & & & \vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 42\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 12\sqrt{2} & 0 & 42\sqrt{2} & 0 \\ -5 & 0 & 0 & 42\sqrt{2} \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} {}^tM & & & -{}^tM\vec{u} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & = \left(\begin{array}{cccc} 30\sqrt{2} & 16\sqrt{2} & -20\sqrt{2} & 24\sqrt{2} \\ \frac{27}{\sqrt{2}} & 24\sqrt{2} & \frac{45}{\sqrt{2}} & -27\sqrt{2} \\ -9\sqrt{2} & 12\sqrt{2} & 27\sqrt{2} & 18\sqrt{2} \\ -\frac{3}{\sqrt{2}} & 2\sqrt{2} & -\frac{5}{\sqrt{2}} & 45\sqrt{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

である.

$P(3, 2, -1)$ の同次座標を $(3; 2 : -1 : 1)$ とすると

$$\Phi_V(P) = \begin{pmatrix} 30\sqrt{2} & 16\sqrt{2} & -20\sqrt{2} & 24\sqrt{2} \\ \frac{27}{\sqrt{2}} & 24\sqrt{2} & \frac{45}{\sqrt{2}} & -27\sqrt{2} \\ -9\sqrt{2} & 12\sqrt{2} & 27\sqrt{2} & 18\sqrt{2} \\ -\frac{3}{\sqrt{2}} & 2\sqrt{2} & -\frac{5}{\sqrt{2}} & 45\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 166\sqrt{2} \\ 39\sqrt{2} \\ -12\sqrt{2} \\ 47\sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{47} \begin{pmatrix} 166 \\ 39 \\ -12 \end{pmatrix}$$

である.

実際, $\vec{v} = (8, -9, 6)$, $\vec{n} = (3, -4, 5)$, $d = 6$ として, 一般の透視投影の公式 (p.3) を用いて投影像を求めると

$$\begin{aligned} \Phi_V(P) &= \vec{p} + \frac{d - \langle \vec{p}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{v} - \vec{p}, \vec{n} \rangle} (\vec{v} - \vec{p}) \\ &= (3, 2, -1) + \frac{6 - (9 - 8 - 5)}{\langle (5, -11, 7), (3, -4, 5) \rangle} (5, -11, 7) \\ &= (3, 2, -1) + \frac{10}{15 + 44 + 35} (5, -11, 7) \\ &= (3, 2, -1) + \frac{5}{47} (5, -11, 7) \\ &= \frac{1}{47} ((141, 94, -47) + (25, -55, 35)) \\ &= \frac{1}{47} (166, 39, -12) \end{aligned}$$

である.

問題 5.26. (省略)